



**PATIENT
EDUCATION**

Tilmaamaha Nadiifinta Caloosha Beeritaanka Saxarada Lagu Beero Mindhicirada Dulcolax/Miralax

Waa muhim in aad raacdo dhamaan talooyinka halkan lagu soo xusay si aad ugu diyaar garoowdo beeritaanka saxarada qeybta hoose ee mindhicirada. Mindhiciradaadu waa in ay marnaadaan, si dhakhtarku u arki karo xilliga baariitaanka. Qaar badan oo bukaanka ka mid ah ayaa dareema in nadiifinta caloosha ay tahay qeybta ugu adag beeritaanka saxarada ee qeybta hoose ee mindhicirada.

U diyaargaroowga beeritaanka saxarada lagu beero mindhicirada

- Maalinka ka horeysa maalinta beeritaanka saxarada ee qeybta kore ee mindhicirada., waa in aad bilowdaa diyaarinta calooshaada.
- Ha cunin cunto adag maalinta ka horeysa baariitaanka.
- Waxa aad isticmaaleysaa Miralax si aad calooshaada u diyaariso oo aad i nadiifiso mindhicirkaaga.
- Haddii horay kuugu dhaceen cudurada wadnaha noocyadiisa kala duwan, waa in aadan qaadan dawada caloosha jilcisa ee Miralax oo la xiriir dhakhtarkaer kuu qoray baariitaanka.
- Fadlan raac tilmaamahan dhamaantood si taxadar leh. Haddii aadan tilmaamahan u raacin si sax ah, waxaa laga yaabaa in balantaada beeritaanka saxarada ee qeybta hoose ee mindhicirada la baajiyo.

Waxyaabaha aad iibsaneyso

- Si aad isugu diyaariso baariitaanka, waxaa lagaa doonayaa in aad iibsato waxyaabaha halkan ku xusan oo lagu nadiifiyo caloosha.
- **Looma baahna daawo dhakhtar kuu qoro**
 - Afar (4) oo xabo oo kiniinka Bisacodyl/Dulcolax (5mg). Waa in uu noqdaa kiniinka afka laga qaato.
 - Miralax (8.3 wiqiyadood / 238 grams)
 - Cabitaanka Gatorade (64 wiqiyadood ah) midabkii aad doonto marka laga reebo casaanka ama hurdiga.
 - Waxa aad iibsan kartaa laba dhalo oo 32 wiqiyadood ah oo Gatorade ah.

Macluumaadka Daawada

Waxaa laga yaabaa in lagaa doonayo in aad joojiso qaar ka mid ah daawooyinka aad qaadato ama aad wax ka bedesho baariitaanka ka hor.

- **Dhiig Khafiifiyayaasha**
 - Sida (warfarin), Ticlid (ticlopidine hydrochloride), Agrylin (anagrelide), Xarelto (Rivaroxaban), Pradaxa (Dabigatran), Pletal (Cilostazol), Brillinta (Ticagrelor), Eliquis (Apixaban), Effient (Prasugrel), and Plavix (Clopidogrel).
 - Waa in aad latashataa dhakhtarka daawada kuu qoray ama qof ku takhasusay ugu yaraan 2 todobaad ka hor xilliga balanta. Ha joojin qaadashada daawada adiga oo aan ogolaasho ka helin dhakhtarkaaga.
- **Daawada Insuliinta iyo Macaanka (Sokoroowga)**

- Fadlan la xiriir dhakhtarkaaga la socda heerka sokortaada. Waxaa laga yaabaa in loo baahdo in wax laga bedelo taasoo ku xiran cuntada aad cunto ee loo baahan yahay nadiifinta caloosha. Ha joojin qaadashada daawada adiga oo aan ogolaasho ka helin dhakhtarkaaga.
- **Asbiriin**
 - Waxaa laga yaabaa in aad qaadan karto Aasbiriinka sida dhakhtarku kuugu qoray adiga oo biyo ku kabanaya

Shan (5) maalmood ka hor maalinta beeritaanka saxarada ee qeybta kore ee mindhicirada

- Ha qaadan daawooyinka caloosha socota (shubanka) joojiya.
 - Tusaale ahaan: Imodium ama Pepto-Bismol.
- Ha qaadan daawooyinka caloosha jilciya ama fitamiinada dheeraadka ah.
 - Tusaale ahaan: Metamucil ama Citrucel.
- Ha qaadan daawooyinka laga helo birta ama lagu bedesho daawada birta.
 - Tusaale: Fitamiinada kala duwan (Multi-vitamins).
- Ha qaadan daawooyinka laga sameeyo saliidda kaluunka ee aan dhakhtar qorin..

Sadex (3) maalmood ka hor baaritaanka saxarada ee qeybta kore ee mindhicirada

- Ku bilow cunto fudud oo ay ku yar yihiin waxyaaba caloosha jilciya. Cuntada ay ku yar tahay waxyaabaha caloosha jilciya waxa ay caawisaa in ay si wanaagsan u nadiifiso caloosha.
- Cuntada caloosha jilcisa waxaa ka mid ah:
 - Rootiga cad, bariiska cad, baastada, buskudka, kaluunka, digaaga, ukunta, hilib shiidan, lawska shiidan, khudaar la kariyey, faakiho gasacadeysan, mooska, batiikh, caanaha, garoorka, farmaajada, waxyaabaha la mariyo ansalaatada iyo carfiyayaasha cuntada.
- Ha cunin cunto ay ku badan tahay waxyaabaha caloosha jilciya sida:
 - Daangada, miraha (noocyada kala duwan ee miraha la qariido sida gabal dayaha), rootiga ama baastada ka sameysan qamadiga, miraha la qalajiyey, ansalaatada, khudaarta ceyriin, faakihada cusub ama la qalajiyey. Xadid tirada aad hilibka ka cunto.

laba (2) maalmood ka hor maalinta beeritaanka saxarada ee mindhicirada.

- Cabitaanka biyaha badso.
- Ku bilow cunto fudud oo ku yar yihiin waxyaabaha caloosha jilciya.

Imaatinka Isbitaalka ee Subaxa hore

(6:30 aroornimo ilaa 11:45 aroornimo)

Hal (1) maalin ka hor maalinta beeritaanka saxarada ee mindhicirada.

- Biloow cabitaanka biyo cad.
- Cab biyo cad oo kaliya maalinta ka horeysa oo dhan maalinta beeritaanka saxarada ee mindhicirada.
- Biyaha cad waxaa ka mid ah:
 - Biyo, qaxwe madoow, ama shaah (aan caano ama boolbire laheyn), maraq cad ama baroodo cad, Gatorade, biyo ubriya kuwa aan ubrin (Coke, Sprite), cabitaan casiir aan miro laheyn (tufaax, cinabka cad, karambari cad), Jell-O, ama jalaato baraf. **Xusuusnoow, ha cabin cabitaan casaan ama midabka hurdiga ah.**
- Ha cunin wax cunto ah oo adag.
- 9 aroornimo qaado afarta xabo ee kiniiniga Bisacodyl/Dulcolax. Waa in aad ka ag dhawaataa suuliga ka dib marka aad qaadato kiniiniga.
- Ku qas Mirlax dhamaan biyaha ku jira dhalada oo 64 wiiqiyadood ah ee Gatorade ilaa ay isku milmaan. Waxyaabaha aad ku qastay waad gelin kartaa talaajadda
- Haddii aad jeceshahay in aad ku cabto iyada oo aan la qaboojin, waxa aad talaajadda ka soo saari kartaa 4ta galabnimo.
- Ha ku darin baraf, sokor, waxyaabaha kale ee u yeela dhadhanka macaan.

- 6da galabnimo bilooow cabitaanka aad isku dartay ee Miralax. Waxa aad cabi kartaa kala bar (32 wiiqiyadood) oo cabitaanka aad isku dartay ah. Isku day in aad cabto koob qaada ilaa sideed wiiqiyadood 15kii daqiiqaba cabitaanka aad isku dartay.
- Dadka qaar baa dareema yalaalugo ama lalabo, dibiro, ama matag. Haddii ay sidaas kugu dhacdo, u naso 15-30 daqiiqo, ka dibna isku day in aad cabitaanka sii wado.
- 7da fiidnimo, waa in aad dhameysataa cabitaanka aad isku dartay oo dhan.
- Ka dib marka aad dhameyso cabitaanka, waxa aad cabi kartaa biyo cad oo kaliya.
- Waa in aad ka ag dhawaataa suuliga ka dib marka aad bilowdo qaadshada daawada. Waxaa kugu dhacaya shuban waxaadna u baahaneysaa in aad si degdeg ah u gaarto suuliga. Dadka qaar baa dareema yalaalugo ama lalabo, dibiro, ama matag inta ay cabayaan biyaha caloosha lagu nadiifinayo.
- Ha qaadan daawooyinka galabnimada **Vancomycin ama kuwa kua caabuqa (antibiotics) ee dhakhtarku kuu qoray**. Haddii aanu sidaas ku farin dhakhtarkaaga.
- Inta soo hartay ee cabitaanka ee 32 wiiqiyadood ku celi talaajadda si aad u cabto subaxa xiga.

Maalinta beeritaanka saxarada ee mindhicirka.

- 3:30 aroornimo, bilooow cabitaanka nuska haray ee cabitaanka aad isku qastay (32 wiiqiyadood). Isku day in aad ku cabto koob qaada sideed wiiqiyadood 15kii daqiiqaba ilaa aad ka dhameyso cabitaanka aad isku dartay. Waa in aad dhameysaa cabitaanka aad isku qastay oo dhan.
- Waxaa lagaa doonayaa in aad cabitaanka dhameyso 4:30 aroornimo.
- Calooshaada ma sameyneyso wax saxaro ah, laakiin biyo midabka jaalaha ah ayaa kaa soconaya.
- Waxa aad cabi kartaa biyo ugu dambeyn laba saacadood ka hor balantaada dhakhtarka.
- Ka fogoow cabitaanka casaanka ama hurdiga ah, caanaha, casiirka boritiinka ah, cabitaan ay alkolo ku jirto, iyo isticmaalka maandooriyayasha. Taasi waxa ay kartaa in balantaada beeritaanka saxarada ee mindhicirada la baajiyo.
- Daawada aad subixii cunto waxa aad ku kaban kartaa biyo.
- Xusuusnow, ha cunin wax cunto ah oo adag.
- Waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in aad siiso waqti ku filan oo aad ku gaarto balantaada maadaama laga yaabo in aad isticmaalka suuliga u baahato oo aad u istaagto.
- Xusuusnoow in aadan qaadan **Vancomycin ama antibiotics** subaxa. Haddii aanu sidaas ku farin dhakhtarkaaga.

□ Imaatinka isbitaalka ee galabnimada

(12:00 galabnimo ilaa 3:45 galabnimo)

Hal (1) maalin ka hor maalinta beeritaanka saxarada ee mindhicirada.

- Bilooow cabitaanka biyo cad.
- Cab biyo cad oo kaliya maalinta ka horeysa oo dhan maalinta beeritaanka saxarada ee mindhicirada.
- Biyaha cad waxaa ka mid ah:
 - Biyo, qaxwe madoow, ama shaah (aan caano ama boolbire laheyn), maraq cad ama baroodo cad, Gatorade, biyo ubriya kuwa aan ubrin (Coke, Sprite), cabitaan casiir aan miro laheyn (tufaax, cinabka cad, karambari cad), Jell-O, ama jalaato baraf. **Xusuusnoow, ha cabin cabitaan casaan ama midabka hurdiga ah.**
- Ha cunin wax cunto ah oo adag.
- 9 aroornimo qaado afarta xabo ee kiniiniga Bisacodyl/Dulcolax. Waa in aad ka ag dhawaataa suuliga ka dib marka aad qaadato kiniiniga.
- Ku qas Mirlax dhamaan biyaha ku jira dhalada oo 64 wiiqiyadood ah ee Gatorade ilaa ay isku milmaan. Waxyaabaha aad ku qastay waad gelin kartaa talaajadda
- Haddii aad jeceshahay in aad ku cabto iyada oo aan la qaboojin, waxa aad talaajadda ka soo saari kartaa 4ta galabnimo.
- Ha ku darin baraf, sokor, waxyaabaha kale ee u yeela dhadhanka macaan.

- 6da galabnimo bilow cabitaanka aad isku dartay. Waxa aad cabi kartaa kala bar (32 wiiqiyadood) oo cabitaanka aad isku dartay ah. Isku day in aad cabto koob qaada ilaa sideed wiiqiyadood 15kii daqiiqaba cabitaanka aad isku dartay.
- Dadka qaar baa dareema yalaalugo ama lalabo, dibiro, ama matag. Haddii ay sidaas kugu dhacdo, u naso 15-30 daqiiqo, ka dibna isku day in aad cabitaanka sii wado.
- 7da fiidnimo, waa in aad dhameysataa cabitaanka aad isku dartay oo dhan.
- Ka dib marka aad dhameyso cabitaanka, waxa aad cabi kartaa biyo cad oo kaliya.
- Waa in aad ka ag dhawaataa suuliga ka dib marka aad bilowdo qaadshada daawada. Waxaa kugu dhacaya shuban waxaadna u baahaneysaa in aad si degdeg ah u gaarto suuliga. Dadka qaar baa dareema yalaalugo ama lalabo, dibiro, ama matag inta ay cabayaan biyaha caloosha lagu nadiifinayo.
- Ha qaadan daawooyinka galabnimada **Vancomycin ama kuwa kua caabuqa (antibiotics) ee dhakhtarku kuu qoray**. Haddii aanu sidaas ku farin dhakhtarkaaga.
- Inta soo hartay ee cabitaanka ee 32 wiiqiyadood ku celi talaajadda si aad u cabto subaxa xiga.

maalin ka hor baaritaanka saxarada ee qeybta kore ee mindhicirada

- **Shan** saacadood kahor baaritaankaaga mindhicirka weyn iyo malawadka bilow cabitaanka 32-ka wiiqiyadood ee hadhay ee daawada isdiyaarinta. Isku day inaad cabto koob qaada sideed-wiiqiyadood oo ah daawada isdiyaarinta 15kii daqiiqaba mar ilaa ay dhamaanayso diyaarinta caloosha. Waxay kugu qaadan doontaa hal saacad in aad dhameyso cabitaanka.
- Waa in aad ka ag dhawaataa suuliga ka dib marka aad bilowdo qaadashada daawada isdiyaarinta. Waad shubmi doontaa waxaanad u baahan doontaa inaad si degdeg ah u gaadho suuliga.
- Dadka qaar ayaa dareemi kara yalaalugo, dibiro, ama matagi kara inta ay cabayaan daawada diyaarinta caloosha. Haddii ay tani dhacdo, qaado nasasho 15 daqiiqo ah, kadibna isku day inaad cabto daawada isdiyaarinta.
- Saxaradaadu ma sameysmi doonto waxaanay noqon doontaa dareere bilaa midab ah ama jaale ah.
- Waxaad cabi kartaa dareerayaasha bilaa midabka ah ilaa laba saacadood kahor wakhtiga aad is xaadirinayso.
- Ha cabin dareerayaasha casaanka ama basaliga ah, waxyaabaha caanaha ka sameysan, cabitaanada boratiinka ah, cabitaanada alkoolada ah, tukaabada la calaliyo, iyo daawooyinka sharci darada ah. Adeegsiga waxyaabahani waxay sababi doonaan in baaritaankaaga la baajiyo.
- Waxaad sidoo kale daawooyinkaaga ku qaadan kartaa kabbasho biyo ah.
- Xusuusnow, ha cunin cuntooyinka adag.
- Waxaad u baahan kartaa inaad wakhti dheeraad ah siiso tagista ballantaada maadaama aad u baahan karto inaad joogsato oo isticmaasho musqul inta aad soo socotid.
- Xusuuso inaad qaadatid daawadaada **Vancomycin ama antibiotics** subaxdii. Haddii uu si kale dhakhtar kuu sheego mooyee.

Fariin/Tilmaamo gaar ah: